



MB 084 MINŐSÉGÜGYI BIZONYLAT BETEGTÁJÉKOZTATÓ PUPILLATÁGÍTÁSRÓL

Betegtájékoztató pupillatágításról

Beavatkozás célja: A pupilla tágítására szemfenék vizsgálatához és a szem objektív fénytörésének meghatározása céljából van szükség.

Igen fontos vizsgálatról van szó. A szemfenék vizsgálattal számos szembetegségre deríthetünk fényt, de különös jelentősége van bizonyos általános betegségek (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség) állapotának megítélésében is.

Diagnosztikus pupillatágítás létrehozása

Felnőtteknek és 6 évesnél idősebb gyermekeknek 1 csepp Unitropic vagy Cicloplegicedol vagy Humapent szemcseppet kell a kötőhártyaszákba cseppenteni és kb. 20-30 percet kell várni, hogy csepp kifejtsé hatását.

Kontaktlencsét viselők

Ha kontaktlencsét visel, távolítsa el azokat a szemcsepp alkalmazása előtt. A szemcsepp alkalmazását és a vizsgálatot követően várnia kell 30 percet, mielőtt visszahelyezi a kontaktlencséket. Kérjük, a vizsgálat előtt sminkjét távolítsa el.

A készítmény hatásai:

1. Átlagosan néhány óra időtartamra tágítja ki a pupillát. Hatására a távoli és a közeli látásélesség romlik, a szem alkalmazkodási készsége csökken.
2. A szemcsepp alkalmazása után látászavar (homályos látás) léphet fel, és a pupillatágulat miatt fokozott fényérzékenységgel lehet számolni. Mindezek hátrányosan befolyásolják a gépjárművezetést, illetve a gépek kezelését.
3. Gépjárművet vezetni, és balesetveszéllyel járó munkát végezni csak a fenti hatások elmúltával szabad, azaz amikor a pupillatágulat és a látászavar, fényérzékenység, vagy más lehetséges nemkívánatos hatás megszűnik. (Ez az idő egyénileg eltérő, kb. néhány óra)

ai